

CRIBADO Y DIAGNÓSTICO DEL TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA EN ATENCIÓN PRIMARIA.

VALIDACIÓN DEL GAD-7 CON LA CIDI EN EL PROYECTO PSICAP.

Muñoz-Navarro, R.; Cano-Vindel, A.; Wood, C.M.; Ruiz-Rodríguez, P.; Gracia, I.; Tomás, P.; Jiménez-Cabré, G.; Medrano, L; Moriana, J.A.; Dongil, E.; Iruarrizaga, I.; Chacón, F.; Santolaya, F.; Gómez, M.D.; Pizà, M.R.; Rodríguez, M.; Agüero, L.; Font, M.A.; Abellán, C.; Hermosilla, A.M.; Aguilar, M.M.;

Grupo de Investigación PsicAP

LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA

Los Trastornos de Ansiedad más prevalentes en los centros de AP españoles son

12.6%

TRASTORNO DE PÁNICO

31.2%

T. ANSIEDAD GENERALIZADA

16.5%

T. ANSIEDAD SOCIAL

GENERAN UN GRAN COSTE SOCIAL TANTO EN COSTES DIRECTOS COMO INDIRECTOS

N Total: 1126



≈15% N = 178

298 PACIENTES FUERON RECLUTADOS EN EL 2014 POR MAPS DE 5 CENTROS

260 pacientes → PHQ

178 pacientes → PHQ + SCID-I

GAD-7

ROC CURVE

SENSIBILIDAD
ESPECIFICIDAD


+/- VALORES PREDICTIVOS

+/- LR

Composite International
Diagnostic Interview
(CIDI) (Core Version
1.1): Interviewer Manual

World Health Organization

Note: This is not the actual book cover.



Área bajo de la curva = .87 (95% IC: .80- .92)

Propiedades Psicométricas del GAD-7

Punto de Corte	Sensibilidad	Especificidad	Valor predictivo positivo	Valor predictivo negativo	Ratio de Probabilidad positiva	Ratio de Probabilidad negativa
GAD-7 \geq 8	.93 (.87–.96)	.61 (.46–.74)	.89	.71	2.38 (1.62–3.50)	.12 (.06–.23)
GAD-7 \geq 9	.91 (.84–.94)	.71 (.56–.82)	.91	.69	3.09 (1.92–4.99)	.13 (.08–.23)
GAD-7 \geq 10	.87 (.80–.92)	.78 (.63–.88)	.93	.64	3.96 (2.21–7.07)	.17 (.11–.27)
GAD-7 \geq 11	.76 (.68–.82)	.78 (.63–.88)	.92	.49	3.46 (1.93–6.21)	.31 (.22–.43)
GAD-7 \geq 12	.72 (.63–.78)	.80 (.66–.90)	.92	.46	3.67 (1.95–6.89)	.35 (.26–.48)
GAD-7 \geq 13	.68 (.60–.75)	.85 (.72–.93)	.94	.44	4.64 (2.19–9.80)	.38 (.29–.50)
GAD-7 \geq 14	.59 (.51–.67)	.88 (.74–.95)	.94	.39	4.85 (2.11–11.15)	.47 (.37–.59)

Como test de cribado, el GAD-7 mostró una elevada sensibilidad of .87 y una buena especificidad de .78 con un punto de corte de 10, indicando una gran eficacia en la detección de verdaderos positivos con un reducido número de falsos positivos.

Por lo tanto se recomienda el uso del GAD-7 al ser una herramienta útil para detectar de forma rápida el Trastorno de Ansiedad Generalizada en los centros de AP españoles.

Madrid


13 de noviembre de 2015

CONSEJO GENERAL DE LA PSICOLOGÍA DE ESPAÑA

IV Jornada de Psicología Clínica en Atención Primaria



PsicAP



Psicología en Atención Primaria

FUNDACIÓN
MUTUAMADRILEÑA

